

*M. M.*

**PROVA SCRITTA - TRACCIA 1**

**Le seguenti domande prevedono un'unica risposta.**

**1. La diagnosi rapida di varicella zoster viene eseguita su:**

- a) Leucociti del sangue periferico
- b) Cellule del gargarizzato faringeo
- c) Scraping delle vescicole cutanee
- d) Cellule del sedimento urinario
- e) Biopsia cutanea

**2. Streptococchi emolitici di tipo alfa (viridanti) sono normalmente presenti nel cavo orale di:**

- a) Tutti i soggetti
- b) Nessun soggetto
- c) Solo pazienti immunocompromessi
- d) Solo pazienti con malattia reumatica
- e) Solo soggetti oltre i 60 anni di età

**3. Qual'è il colore delle macule roseoliche della sifilide secondaria?**

- a) Avorio
- b) Roseo "fior di pesco"
- c) Roseo "magro di prosciutto"
- d) Rosso-bruno
- e) Bruno-ardesiaco

**4. Le linee guida per il trattamento delle infezioni da *Mycoplasma genitalium* in caso di resistenza ad azitromicina prevedono:**

- a) Doxiciolina 100mg x 2 x 7
- b) Moxifloxacina 400mg dose singola
- c) Moxifloxacina 400mg per 7 – 10 giorni
- d) Pristinamicina 1gr x4 die per 7-10 giorni
- e) Azitromicina 500mg dose singola

**5. Di quale malattia cutanea è tipica la caduta del terzo esterno del sopracciglio?**

- a) Psoriasi
- b) Lichen planus
- c) Vitiligine
- d) Dermatite atopica
- e) Sifilide secondaria

**6. Il ceppo di *Chlamydia trachomatis* responsabile della maggior parte dei casi di linfogranuloma venereo in Italia è il ceppo:**

- a) L1
- b) L2
- c) L3
- d) D
- e) K



**7. In Italia i genotipi di treponema pallido di più frequente riscontro sono:**

- a) 13D
- b) 6D e 10F
- c) 14D
- d) 13B e 13E
- e) A e C

**8. Una coltura positiva da tampone faringeo per streptococco viridans impone:**

- a) Terapia antibiotica ad ampio spettro per 2 settimane
- b) Terapia con Azitromicina per 3 gg.
- c) Terapia endovena con Vancomicina
- d) Terapia con Penicillina per 10 gg.
- e) Nessuna delle precedenti

**9. Il bersaglio, a livello batterico, dell'attività delle penicilline è rappresentato da:**

- a) Sintesi proteica
- b) Parete cellulare
- c) Membrana cellulare
- d) Metabolismo cellulare
- e) Sintesi di DNA

**10. Qual'è la morfologia più comune nelle eruzioni esantematiche da farmaci?**

- a) Morbilliforme
- b) Roseoliforme
- c) Eritrodermica
- d) Psoriasiforme
- e) Pustolosa

**11. L'orchite come complicanza della parotite non può osservarsi all'età di:**

- a) 3-5 anni
- b) 16-20 anni
- c) 20-30 an
- d) 30-40 anni
- e) 40-50 anni

**12. Quale è il meccanismo d'azione dei fluorochinoloni?**

- a) Inibizione della DNA-girasi
- b) Inibizione della sintesi proteica
- c) Inibizione della sintesi della parete batterica
- d) Alterazione della funzione di barriera delle membrane biologiche
- e) Inibizione della sintesi del peptidoglicano

**13. Uno dei seguenti virus è causa delle verruche cutanee:**

- a) ECHO
- b) Corona
- c) Papova
- d) Adeno
- e) EBV



**14. Qual'è l'agente eziologico delle verruche comuni?**

- a) Human papilloma virus
- b) Epstein Barr virus
- c) Citomegalovirus
- d) Pox virus
- e) Herpes simplex virus

**15. Quanti sono i genotipi ad oggi noti di HCV:**

- a) 2
- b) 20
- c) 3
- d) 40
- e) 6

**16. Nel nostro paese in quale decade della vita attualmente prevale l'infezione da HIV?**

- a) Età estreme della vita
- b) Età pediatrica
- c) Tra i 60/70 anni
- d) Tra i 20/30 anni
- e) Tra i 30/40 anni

**17. Indicare quale delle asserzioni relative all'epatite B non è corretta:**

- a) Il più importante serbatoio d'infezione è costituito dai soggetti con infezione acuta
- b) Circa il 2% della popolazione italiana è portatore cronico del virus dell'epatite B
- c) In Italia l'infezione è ancora assai diffusa
- d) In Italia il tasso d'incidenza della malattia si è ridotto in modo sensibile negli ultimi 10-15 anni
- e) La frequenza di cronicizzazione dell'infezione è superiore al 2%

**18. In quale malattia cutanea il condiloma piano è presente?**

- a) Infezione da Herpes simplex virus
- b) Infezione da Human papilloma virus
- c) Sifilide secondaria
- d) Pemfigo vegetante
- e) Mollusco contagioso

**19. Quale malattia causa Haemophilus ducreyi?**

- a) Condilomi acuminati
- b) Sifilide
- c) Ulcera molle
- d) Gonorrea
- e) Linfogranuloma venereo

**20. L'epatite cronica B " atipica" è caratterizzata da:**

- a) HBe Ag e HBV-DNA negatività
- b) Anti-HBe positività e HBV-DNA negatività
- c) HBe Ag positività e HBV-DNA negatività
- d) HBe Ag e HBV-DNA positività
- e) Anti HBe e HBV-DNA positività

**21. In quale malattia si riscontrano le "chiazze opaline"?**

- a) Sifilide terziaria
- b) Sifilide primaria
- c) Lichen planus
- d) Leucoplachia
- e) Sifilide secondaria

**22. La positività dei marcatori HBsAb e HBcAb con negatività di HBsAg indica:**

- a) Infezione in atto
- b) Vaccinazione effettuata
- c) Pregressa infezione
- d) Infezione da HBV e HDV
- e) Infezione da HCV

**23. Quali delle sottoriportate affermazioni relative alla sifilide è corretta?**

- a) Il sifiloma si sviluppa sempre nella sede di inoculo
- b) Il sifiloma può sfuggire all'osservazione clinica
- c) Il sifiloma può manifestarsi in modo "abortivo"
- d) Il sifiloma può presentarsi alla mucosa orale
- e) Tutte le precedenti

**24. Balanopostite recidivante: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?**

- a) La balanopostite recidivante è frequente nei soggetti affetti da sifilide
- b) La balanopostite recidivante è frequente nei diabetici
- c) La balanopostite è sempre trasmessa per via sessuale
- d) Tutte le precedenti
- e) Nessuna delle precedenti

**25. Un quadro clinico caratterizzato da ulcerazioni dei genitali a margini non induriti e notevolmente dolenti a cui si associano linfadenopatie con suppurazione dei linfonodi è suggestivo di infezione da:**

- a) Treponema pallidum (Sifilide primaria)
- b) Treponema pallidum (Sifilide secondaria)
- c) Haemophilus ducrey
- d) Nisseria gonorrhoeae
- e) Chlamydia trachomatis

**26. Qual'è la manifestazione più frequente dell'infezione gonococcica nella donna?**

- a) Proctite
- b) Vaginite
- c) Uretrite
- d) Cervicite
- e) Cistite

**27. Condilomi piani: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?**

- a) Sono contagiosi
- b) Sono di natura virale
- c) Hanno periodo di incubazione è di circa 6 giorni
- d) Si localizzano sul dorso delle mani
- e) Nessuna delle precedenti

**28. Human papilloma virus causa le sottoriportate patologie tranne una: quale?**

- a) Condiloma acuminato
- b) Epidermodisplasia verruciforme
- c) Tumore di Buschke-Lowenstein
- d) Verruca volgare
- e) Mollusco contagioso

**29. La resistenza di *Mycoplasma Genitalium* ad azitromicina è riportata essere in Europa fino al:**

- a) 10%
- b) 30%
- c) 50%
- d) 80%
- e) Nessuna delle precedenti

**30. Quale fra le sotto riportate malattie a trasmissione sessuale è causata da *Chlamydia trachomatis*?**

- a) Ulcera molle
- b) Granuloma inguinale
- c) Linfogranuloma venereo
- d) Papillomi venerei
- e) Molluschi contagiosi

REGIONE LOMBARDA  
ATS  
CITTÀ METROPOLITANA  
MILANO

**PROVA SCRITTA - TRACCIA 2**

**Le seguenti domande prevedono un'unica risposta.**

**1. La diagnosi rapida di varicella zoster viene eseguita su:**

- a) Leucociti del sangue periferico
- b) Cellule del gargarizzato faringeo
- c) Scraping delle vescicole cutanee
- d) Cellule del sedimento urinario
- e) Biopsia cutanea

**2. Quale è il meccanismo d'azione dei fluorochinoloni?**

- a) Inibizione della DNA-girasi
- b) Inibizione della sintesi proteica
- c) Inibizione della sintesi della parete batterica
- d) Alterazione della funzione di barriera delle membrane biologiche
- e) Inibizione della sintesi del peptidoglicano

**3. Qual'è la morfologia più comune nelle eruzioni esantematiche da farmaci?**

- a) Morbilliforme
- b) Roseoliforme
- c) Eritrodermica
- d) Psoriasiforme
- e) Pustolosa

**4. Una coltura positiva da tampone faringeo per streptococco viridans impone:**

- a) Terapia antibiotica ad ampio spettro per 2 settimane
- b) Terapia con Azitromicina per 3 gg.
- c) Terapia endovena con Vancomicina
- d) Terapia con Penicillina per 10 gg.
- e) Nessuna delle precedenti

**5. La tetraide sintomatologia della mononucleosi infettiva è costituita da:**

- a) Febbre esantema epatomegalia pallore
- b) Febbre angina splenomegalia polilinfoadenopatia
- c) Epatomegalia, diarrea, dolori addominali, esantema
- d) Febbre, pallore, epatomegalia, splenomegalia
- e) Esantema, diarrea, artralgie, cefalea

**6. Gli aminoglicosidi sono antibiotici:**

- a) Tempo-dipendenti
- b) Concentrazione-dipendenti
- c) Gastrolesivi
- d) Fotosensibili
- e) Da somministrare solo per via orale

M

**7. Qual'è l'agente eziologico delle verruche comuni?**

- a) Human papilloma virus
- b) Epstein Barr virus
- c) Citomegalovirus
- d) Pox virus
- e) Herpes simplex virus

**8. Quanti sono i genotipi ad oggi noti di HCV:**

- a) 2
- b) 20
- c) 3
- d) 40
- e) 6

**9. A quale tipo di sieroreazione appartiene VDRL?**

- a) Emoagglutinazione
- b) Immunofluorescenza
- c) ELISA
- d) Microflocculazione
- e) RIA

**10. In quale malattia si riscontrano le "chiazze opaline"?**

- a) Sifilide terziaria
- b) Sifilide primaria
- c) Lichen planus
- d) Leucoplachia
- e) Sifilide secondaria

**11. Esiste un'associazione tra infezione da HCV ed epatocarcinoma:**

- a) No
- b) Sì, solo in coinfezione con HBV
- c) Nel 40 % dei casi
- d) Nell'80% dei casi
- e) Nell'1-3 % dei casi

**12. Dopo quanto tempo dal contagio insorge la sifilide secondaria?**

- a) 1 settimana
- b) 2-3 settimane
- c) 2 mesi
- d) 6 mesi
- e) Anni

**13. In caso di allergia alla penicillina, quale farmaco viene utilizzato nella terapia della sifilide?**

- a) Tetraciclina
- b) Rifampicina
- c) Sulfamidici
- d) Spectinomocina
- e) Imidazolici



**14. Qual'è il periodo medio di incubazione della sifilide primaria?**

- a) 12-36 ore
- b) 2-5 giorni
- c) 2-4 settimane
- d) 2-4 mesi
- e) 7-10 mesi

**15. In quale malattia cutanea il condiloma piano è presente?**

- a) Infezione da Herpes simplex virus
- b) Infezione da Human papilloma virus
- c) Sifilide secondaria
- d) Pemfigo vegetante
- e) Mollusco contagioso

**16. Qual'è il colore delle macule roseoliche della sifilide secondaria?**

- a) Avorio
- b) Roseo "fior di pesco"
- c) Roseo "magro di prosciutto"
- d) Rosso-bruno
- e) Bruno-ardesiaco

**17. Un paziente di 24 anni presenta alla superficie volare dei polsi piccole papule poligonali, di colorito rosso-lilla, pruriginose. Qual'è il sospetto diagnostico?**

- a) Dermatite atopica
- b) Sifilide secondaria
- c) Lichen planus
- d) Dermatite da contatto cronica
- e) Scabbia

**18. La sede più frequente di sifilomi extragenitali è:**

- a) Regione anale
- b) Cavo orale
- c) Occhio
- d) Cute in generale
- e) Bocca

**19. In Italia i genotipi di treponema pallido di più frequente riscontro sono:**

- a) 13D
- b) 6D e 10F
- c) 14D
- d) 13B e 13E
- e) A e C



2

**20. Un quadro clinico caratterizzato da ulcerazioni dei genitali a margini non induriti e notevolmente dolenti a cui si associano linfadenopatie con suppurazione dei linfonodi è suggestivo di infezione da:**

- a) Treponema pallidum (Sifilide primaria)
- b) Treponema pallidum (Sifilide secondaria)
- c) Haemophilus ducrey
- d) Nisseria gonorrhoeae
- e) Chlamydia trachomatis

**21. Qual'è la manifestazione più frequente dell'infezione gonococcica nella donna?**

- a) Proctite
- b) Vaginite
- c) Uretrite
- d) Cervicite
- e) Cistite

**22. Sarcoma di Kaposi: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?**

- a) E' una malattia linfoproliferativa
- b) Le lesioni sono di aspetto angiomatoide
- c) L'eziologia è batterica
- d) E' una malattia esclusivamente cutanea
- e) E' una disemбриoplasia vascolare

**23. Condilomi piani: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?**

- a) Sono contagiosi
- b) Sono di natura virale
- c) Hanno periodo di incubazione è di circa 6 giorni
- d) Si localizzano sul dorso delle mani
- e) Nessuna delle precedenti

**24. Balanopostite recidivante: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?**

- a) La balanopostite recidivante è frequente nei soggetti affetti da sifilide
- b) La balanopostite recidivante è frequente nei diabetici
- c) La balanopostite è sempre trasmessa per via sessuale
- d) Tutte le precedenti
- e) Nessuna delle precedenti

**25. La resistenza di Micoplasma Genitalium ad azitromicina è riportata essere in Europa fino al:**

- a) 10%
- b) 30%
- c) 50%
- d) 80%
- e) Nessuna delle precedenti

REGIONE LOMBARDA  
ATS  
CITTA' METROPOLITANA  
MILANO

26. Le linee guida per il trattamento delle infezioni da *Mycoplasma genitalium* in caso di resistenza ad azitromicina prevedono:

- a) Doxiciclina 100mg x 2 x 7
- b) Moxifloxacina 400mg dose singola
- c) Moxifloxacina 400mg per 7 – 10 giorni
- d) Pristinamicina 1gr x4 die per 7-10 giorni
- e) Azitromicina 500mg dose singola

27. Nel nostro paese in quale decade della vita attualmente prevale l'infezione da HIV?

- a) Età estreme della vita
- b) Età pediatrica
- c) Tra i 60/70 anni
- d) Tra i 20/30 anni
- e) Tra i 30/40 anni

28. Il ceppo di *Chlamydia trachomatis* responsabile della maggior parte dei casi di linfogranuloma venereo in Italia è il ceppo:

- a) L1
- b) L2
- c) L3
- d) D
- e) K

29. Una delle affermazioni sottoriportate non è corretta in caso di diagnosi di herpes zoster: quale?

- a) L'eruzione è caratterizzata da chiazze eritemato-vescicolari
- b) Le vescicole sono riunite in grappoli
- c) L'eruzione è metamerica
- d) Le recidive sono frequenti
- e) La vescicola può evolvere in pustola

30. L'epatite cronica B " atipica " è caratterizzata da:

- a) HBe Ag e HBV-DNA negatività
- b) Anti-HBe positività e HBV-DNA negatività
- c) HBe Ag positività e HBV-DNA negatività
- d) HBe Ag e HBV-DNA positività
- e) Anti HBe e HBV-DNA positività





PROVA SCRITTA - TRACCIA 3

Le seguenti domande prevedono un'unica risposta.

1. Sifiloma: quale delle sottoriportate affermazioni è corretta?

- a) E' un nodulo eroso
- b) Non si associa mai a linfadenopatia regionale
- c) Nella donna si localizza esclusivamente alle grandi labbra
- d) Nel maschio si localizza esclusivamente al glande
- e) E' sempre unico

2. Quale delle sottoriportate caratteristiche non è peculiare dell'herpes simplex labiale?

- a) Lesioni vescicolose raggruppate
- b) Sensazione di bruciore-fastidio prima dell'eruzione
- c) Associazione con la dermatite erpetiforme di Duhring
- d) Storia di precedenti eruzioni
- e) L'esposizione al sole può scatenare l'eruzione

3. I seguenti sono tutti parassiti intracellulari obbligati eccetto:

- a) Neisseria meningitidis
- b) Chlamydia trachomatis
- c) Rickettsia conori
- d) Toxoplasma gondii
- e) Herpesviridae

4. Streptococchi emolitici di tipo alfa (viridanti) sono normalmente presenti nel cavo orale di:

- a) Tutti i soggetti
- b) Nessun soggetto
- c) Solo pazienti immunocompromessi
- d) Solo pazienti con malattia reumatica
- e) Solo soggetti oltre i 60 anni di età

5. Il ceppo di Chlamydia trachomatis responsabile della maggior parte dei casi di linfogranuloma venereo in Italia è il ceppo:

- a) L1
- b) L2
- c) L3
- d) D
- e) K

6. Quale è il meccanismo d'azione dei fluorochinoloni?

- a) Inibizione della DNA-girasi
- b) Inibizione della sintesi proteica
- c) Inibizione della sintesi della parete batterica
- d) Alterazione della funzione di barriera delle membrane biologiche
- e) Inibizione della sintesi del peptidoglicano



1

7. La tetrade sintomatologia della mononucleosi infettiva è costituita da:

- a) Febbre esantema epatomegalia pallore
- b) Febbre angina splenomegalia polilinfoadenopatia
- c) Epatomegalia , diarrea, dolori addominali, esantema
- d) Febbre, pallore, epatomegalia, splenomegalia
- e) Esantema, diarrea, artralgie, cefalea

8. Uno dei seguenti virus è causa delle verruche cutanee:

- a) ECHO
- b) Corona
- c) Papova
- d) Adeno
- e) EBV

9. Cos'è la pitiriasi versicolore?

- a) Un'infezione da Candida albicans
- b) Un'infezione da Epidermophyton floccosum
- c) Un'infezione da Trichophyton rubrum
- d) Un'infezione da Pityrosporum (Malassezia)
- e) Un'infezione da germi piogeni

10. Quanti sono i genotipi ad oggi noti di HCV:

- a) 2
- b) 20
- c) 3
- d) 40
- e) 6

11. L'epatite cronica B " atipica" è caratterizzata da:

- a) HBe Ag e HBV-DNA negatività
- b) Anti-HBe positività e HBV-DNA negatività
- c) HBe Ag positività e HBV-DNA negatività
- d) HBe Ag e HBV-DNA positività
- e) Anti HBe e HBV-DNA positività

12. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti la scabbia è FALSA?

- a) E' un'ecto-parassitosi trasmissibile anche per contatto venereo
- b) Il parassita sopravvive solo poche ore nei lenzuoli e vestiti
- c) Due terzi dei cunicoli sono localizzati agli arti superiori
- d) Dopo 24-48 dall'inizio del trattamento il paziente non è più contagioso
- e) I sintomi possono perdurare anche due mesi dopo la fine del trattamento

13. A quale tipo di sieroreazione appartiene VDRL?

- a) Emoagglutinazione
- b) Immunofluorescenza
- c) ELISA
- d) Microflocculazione
- e) RIA

*M. Rossi*  
REGIONE LOMBARDA  
\* AT5 \*  
CITTÀ METROPOLITANA  
MILANO  
\* \* \*  
2

14. In quale malattia si riscontrano le "chiazze opaline"?

- a) Sifilide terziaria
- b) Sifilide primaria
- c) Lichen planus
- d) Leucoplachia
- e) Sifilide secondaria

15. Roseola sifilitica: quale delle sottoriportate affermazioni è corretta?

- a) E' la lesione più precoce del periodo secondario
- b) E' molto pruriginosa
- c) Si localizza elettivamente alla faccia anteriore delle gambe
- d) E' di colore rosso-cianotico
- e) Lascia esiti atrofico-cicatriziali

16. Qual'è il colore delle macule roseoliche della sifilide secondaria?

- a) Avorio
- b) Roseo "fior di pesco"
- c) Roseo "magro di prosciutto"
- d) Rosso-bruno
- e) Bruno-ardesiaco

17. Un paziente di 24 anni presenta alla superficie volare dei polsi piccole papule poligonali, di colorito rosso-lilla, pruriginose. Qual'è il sospetto diagnostico?

- a) Dermatite atopica
- b) Sifilide secondaria
- c) Lichen planus
- d) Dermatite da contatto cronica
- e) Scabbia

18. Una coltura positiva da tampone faringeo per streptococco viridans impone:

- a) Terapia antibiotica ad ampio spettro per 2 settimane
- b) Terapia con Azitromicina per 3 gg.
- c) Terapia endovena con Vancomicina
- d) Terapia con Penicillina per 10 gg.
- e) Nessuna delle precedenti

19. La sede più frequente di sifilomi extragenitali è:

- a) Regione anale
- b) Cavo orale
- c) Occhio
- d) Cute in generale
- e) Bocca

20. In Italia i genotipi di treponema pallido di più frequente riscontro sono:

- a) 13D
- b) 6D e 10F
- c) 14D
- d) 13B e 13E
- e) A e C



21. In quale malattia cutanea il condiloma piano è presente?

- a) Infezione da Herpes simplex virus
- b) Infezione da Human papilloma virus
- c) Sifilide secondaria
- d) Pemfigo vegetante
- e) Mollusco contagioso

22. Un quadro clinico caratterizzato da ulcerazioni dei genitali a margini non induriti e notevolmente dolenti a cui si associano linfadenopatie con suppurazione dei linfonodi è suggestivo di infezione da:

- a) Treponema pallidum (Sifilide primaria)
- b) Treponema pallidum (Sifilide secondaria)
- c) Haemophilus ducrey
- d) Nisseria gonorrhoeae
- e) Chlamydia trachomatis

23. Condilomi piani: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?

- a) Sono contagiosi
- b) Sono di natura virale
- c) Hanno periodo di incubazione è di circa 6 giorni
- d) Si localizzano sul dorso delle mani
- e) Nessuna delle precedenti

24. Human papilloma virus causa le sottoriportate patologie tranne una: quale?

- a) Condiloma acuminato
- b) Epidermodisplasia verruciforme
- c) Condiloma piano
- d) Verruca volgare
- e) Mollusco contagioso

25. Balanopostite recidivante: quale delle affermazioni sottoriportate è corretta?

- a) La balanopostite recidivante è frequente nei soggetti affetti da sifilide
- b) La balanopostite recidivante è frequente nei diabetici
- c) La balanopostite è sempre trasmessa per via sessuale
- d) Tutte le precedenti
- e) Nessuna delle precedenti

26. La resistenza di *Micoplasma Genitalium* ad azitromicina è riportata essere in Europa fino al:

- a) 10%
- b) 30%
- c) 50%
- d) 80%
- e) Nessuna delle precedenti



**27. Le linee guida per il trattamento delle infezioni da *Mycoplasma genitalium* in caso di resistenza ad azitromicina prevedono:**

- a) Doxiciclina 100mg x 2 x 7
- b) Moxifloxacina 400mg dose singola
- c) Moxifloxacina 400mg per 7 – 10 giorni
- d) Pristinamicina 1gr x4 die per 7-10 giorni
- e) Azitromicina 500mg dose singola

**28. La positività dei marcatori HBsAb e HBcAb con negatività di HBsAg indica:**

- a) Infezione in atto
- b) Vaccinazione effettuata
- c) Pregressa infezione
- d) Infezione da HBV e HDV
- e) Infezione da HCV

**29. Nel nostro paese in quale decade della vita attualmente prevale l'infezione da HIV?**

- a) età estreme della vita
- b) età pediatrica
- c) tra i 60/70 anni
- d) tra i 20/30 anni
- e) tra i 30/40 anni

**30. Quanto dura il periodo di incubazione dell'uretrite da *Chlamydia trachomatis*?**

- a) 12-24 ore
- b) 2-5 giorni
- c) 15-20 giorni
- d) 2-4 mesi
- e) 8-12 mesi



**PROVA SCRITTA - TRACCIA 1**

DOMANDA N°	RISPOSTA CORRETTA
1	c
2	a
3	b
4	c
5	e
6	b
7	e
8	e
9	b
10	a
11	a
12	a
13	c
14	a
15	e
16	e
17	a
18	c
19	c
20	e
21	e
22	c
23	e
24	b
25	c
26	d
27	a
28	e
29	d
30	c

**PROVA SCRITTA - TRACCIA 2**

DOMANDA N°	RISPOSTA CORRETTA
1	c
2	a
3	a
4	e
5	b
6	b
7	a
8	e
9	d
10	e
11	e
12	c
13	a
14	c
15	c
16	b
17	c
18	a
19	e
20	c
21	d
22	b
23	a
24	b
25	d
26	c
27	e
28	b
29	d
30	e

**PROVA SCRITTA - TRACCIA 3**

DOMANDA N°	RISPOSTA CORRETTA
1	a
2	c
3	a
4	a
5	b
6	a
7	b
8	c
9	d
10	e
11	e
12	b
13	d
14	e
15	a
16	b
17	c
18	e
19	a
20	e
21	c
22	c
23	a
24	e
25	b
26	d
27	c
28	c
29	e
30	c